

Blé

Grain laiteux à pâteux

La végétation, en train de murir, vire de couleur, sauf pour les blés tardifs qui sont encore bien verts.

État sanitaire : Pour les blés tardifs à très tardifs (Lear), de la rouille brune et jaune sont observées sur F1 dans les témoins non traités.

Pour des Mutic ou des Syllon, des grillures polliniques sont bien visibles et donnent au blé un aspect étrange.

En ce qui concerne les parcelles saines, il est retrouvé de belles taches de *Fusariose nivale* sur les feuilles.

Betterave

Mi couverture à couverture du sol

La couverture tend à se généraliser, sauf dans les zones les plus blanches qui peinent à couvrir le sol.

Ravageurs : Quelques trous de noctuelles sont observés.

État sanitaire : Sur les secteurs ayants reçu beaucoup d'eau, il peut être observé quelques taches de bactériose.

CERCOSPORIOSE

Commune	Comptage	Remarques
Cuperly		Betterave assolée
St Hilaire-au-temple		Bordure de betterave 2017*
Auve	12%	Bordure de betterave 2017*
Suippes	27%	Bordure de betterave 2017*
St Rémy	14%	<i>Libellule</i>
St Hilaire	57%	<i>Optimist</i>
Mourmelon	100%	Betterave de betterave <i>Lareina</i>
Somme-Yvère	7%	20% avec des trous de noctuelles.

* 3 premiers rangs le long de la betterave 2017 touchés, le reste de la parcelle étant sain.

Orge de printemps

Grain laiteux

État sanitaire : Des taches brunes sont observées sur F2.

Pomme de terre de fécule

Floraison

Les plus gros tubercules fils font de 30 à 40 mm de diamètre.

État sanitaire : Quelques pieds isolés présentent des symptômes de virose.

Ravageurs : Les doryphores sont bien présents dans les parcelles. Et l'on retrouve en moyenne 1,5 puceron/feuille.

Maïs

14 feuilles

Les maïs sous plastique mesurent jusqu'à 1m70 de haut.

Il reste encore 2 feuilles à venir avant la sortie de la panicule.

Autres cultures en bref

Escourgeon : La moisson ne saurait tarder !!

Colza : Des grains violets à noirs sont observés. La tige est souvent nécrosées (dégâts du charançon de la tige du chou).

Pois d'hiver : La végétation a changé de couleur selon les veines de terre. Certains pois sont couchés...

Pois de printemps : L'Anthracnose est bien présente dans les parcelles et fait tourner de l'œil des gousses du haut. Ajouté à cela des dégâts de thrips (aspect argenté sur les gousses). Pas de rouille à ce jour.

Captures tordeuses eu total	
Mourmelon	42
Somme-Tourbe	380
Dommartin s/Hans	-

Féverole : 5 à 7 étage de gousses. Floraison finie. Présence de quelques taches d'ascochytose.

Tournesol : Boutons étoilés (4 cm de diamètre).

Lentille : 4 à 5 étages de gousses + 2 étages de fleurs.

Œillette : Boutons cachés à chute des pétales.