



BETTERAVE

Couverture

La végétation est toujours très dense, avec de nouvelles feuilles émises au cœur.

Ravageurs : Aucun dégât ni aucune teigne n'a pour le moment été observé. Les piqûres ont peu évolué et aucun adulte observé à ce jour.

Maladie : La majorité des parcelles du réseau a été mise sous protection il y a plus de 15jrs, les notations IPM ont donc repris ce matin. La pression cerco a augmenté dans les témoins non traités comme en parcelles protégées, mais dans une moindre mesure. Seule la parcelle suivie à Hans atteint le seuil de renouvellement avec plus de 20% de feuilles touchées. Les ronds de mildiou ne semblent pas avoir évolués. Des symptômes de bactériose (Pseudomonas) ainsi que quelques taches de phoma sont toujours observées, sans gravité. Des 1ères taches de ramulariose font leur apparition en témoin non traité (taches grises à brunâtres, avec ponctuation blanches à l'intérieur).

Commune	Date de semis	Variété	% taches cerco
Bussy le Château	14/04	Calledia KWS	7%
Cuperly	12/04	Calledia KWS	7%
Hans	-	-	24%
Saint Rémy sur Bussy	23/04	FD Médaille	16%
Sommepepy	-	-	6%
Somme Bionne	12/04	Dauphin	3%
Somme Suipe	13/04	Novalina/BTS204J	2%
Somme-Tourbe	12/04	Hibou/Caméleon	2%
Somme-Vesle	12/04	Skiff	5%
Somme-Yèvre		FD Pulse	4%
Suippes	12/04	Caméléon	4%
Vadenay		Hibou	10
Vanault les dames	15/04	FD Médaille	4%

RECOLTE

Blé : grain dur

Une partie des parcelles de blé a pu être récoltée, mais la moisson a été mise en pause depuis ce weekend et ne reprendra peut-être pas dans l'immédiat selon la pluviométrie (de 5mm à Suippes jusqu'à 30mm secteur Moivre). Les zones de verse ont pu s'accroître. Les premiers échos de rendement sont décevants.

Orge de printemps : grain dur

La majorité des parcelles a été récoltée, les quelques parcelles encore non fauchées sont celles semées plus tardivement. Comme en blé, la verse se généralise.

Pois de printemps :

Quelques parcelles ont pu être récoltées la semaine dernière, les autres parcelles ne sont pas encore assez mûres, avec des grains encore tendres.

Enquêtes :

[BLE](#) - [OH](#) - [OPA](#) - [OP](#) - [COLZA](#) - [POIS](#)

AUTRES CULTURES

Maïs : 10F à floraison femelle

Les dernières parcelles semées (après le 10-15mai) atteignent 10-12F. A partir de 14-15F, les panicules (floraison mâles) commencent à faire leur apparition. Quelques parcelles plus précoces présentent déjà des poupées (floraison femelle). Des hétérogénéités intra-parcellaires sont toujours observées avec des pieds plus chétifs et jaunes, souvent en bordure de parcelle. +2 pyrales à Verrières (cumul 15).

Tournesol : floraison

Les premières fleurs sont majoritairement visibles dans toutes les parcelles. La croissance continue.

Luzerne : 1ère F cotylédonnaire à 2F trifoliées

Les dernières parcelles semées rayonnent. Les 1ers désherbages sont en cours ou à réaliser : chénos et colzas atteignent déjà 2-4F ! Avec les 1ères récoltes de pois, gîte et couverts ont disparu pour les sitones qui trouvent bien trop facilement les petites luzernes à proximité !